



Grandes cultures

Le 22 Octobre 1987

n°18

COLZA

Charançon du bourgeon terminal

Intervenir du 29/10 au 10/11
dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire

COLZA

(Beaucoup de parcelles irrégulières)
 Stades (- Stades 6 à 8 feuilles - B6-B8 (1ère levée)
 (à 2 à 3 feuilles - B2-B3 (2ème levée))

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

★ Situation

× Puy-de-Dôme et Haute-Loire :

Des captures plus nombreuses sont notées dans plusieurs postes
 dès le 19 Octobre.

× Allier :

Aucune activité à ce jour.

★ Préconisations

Il est conseillé d'intervenir dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire (secteur de BRIOUDE) au cours de la période du 29/10 au 10/11.

Dans l'Allier, attendre nos indications.

Utiliser un pyrèthrinoïde à la dose Grosse Altise
 N.B. - Seul BAYTROID est autorisé.

GROSSE ALTISE

Activité faible à nulle

P.1.2.6

PUCERONS

★ Situation

Les infestations de pucerons verts (*Myzus persicae*) sont en général faibles et ont même tendance à régresser.

★ Préconisations

Seuls les colzas peu avancés peuvent être gênés dans leur développement. Compte-tenu des infestations, un traitement aphicide ne se justifie pas.

DESHERBAGE

Utilisation du CLERDONE

▼ A appliquer sur un colza ayant atteint le stade 4 feuilles, et avec un pivot de plus de 10 cm de long.

▼ Eviter le mélange avec un anti-graminées, ainsi :

☆ réaliser les 2 interventions avec au moins 10 jours d'écart,

☆ pour CLERDONE et GALLANT :

- si GALLANT avant CLERDONE - délai de 3 semaines d'écart

- si CLERDONE avant GALLANT - délai de 10 jours.

CEREALES

Les premiers semis sont en cours.

De rares parcelles d'orge ont levé.

PUCERONS

★ Situation

Sur repousses, les infestations sont faibles, il en est de même sur les céréales levées.

★ Préconisations

Aucune intervention ne se justifie pour l'instant.

Surveiller vos parcelles dès la levée. Ne pas trop se précipiter pour traiter. Attendre un niveau d'infestation de 15 % de plantes colonisées.